

Les gaz réels

Les pressions négatives


ex : équation de Van der Waals

$$\left[\frac{P}{P_c} + \frac{3}{(V/V_c)^2} \right] \left(\frac{V}{V_c} - 1 \right) = 8 \frac{T}{T_c}$$

cohésion de la matière :

forces d'attraction
entre les molécules

⇒ permet la
traction mécanique
= pression négative
dans un liquide



$T/T_c = 1$


$T/T_c = 0.9$

$T/T_c = 0.8$

zone instable

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T > 0$$

Tirer sur l'eau



✓ transitions du premier ordre

⇒ phases séparées par une barrière d'énergie

⇒ metastabilité

liquide étiré à $P < 0$

✓ **cavitation**: nucléation de bulles

⇒ **information sur l'équation d'état et la structure du liquide**

liquide moins dense = plus de liaisons hydrogène?

possibilité d'un point critique à pression négative

eau pure **Brovchenko et al. JCP 2005**

eau salée **Corradini et al. JCP 2010**

Expérience de Huygens 1661

Kell *Am. J. Phys.* 1983

- 1643 : Torricelli invente le baromètre
- 1648 : Pascal fait vérifier par son beau-frère, Florent Perrier, la chute de pression lors de l'ascension du Puy-de-Dôme
- années 1650 :
von Guericke et Boyle
construisent les premières
pompes à vide
- **1661 : Christiaan Huygens
observe l'eau étirée**




Expérience de Huygens 1661

Kell *Am. J. Phys.* 1983

hydrostatique : $\Delta P = \rho g h$
pression atmosphérique
= 0.76 m de mercure
= 10.33 m d'eau

Le récipient A est rempli d'eau
et retourné sur le bain D :
quand l'extérieur est
à pression atmosphérique,
l'eau reste dans A

On fait le vide sous la cloche :
la pression à l'interface D descend à
 $P_{\text{sat}} = 23.4 \text{ mbar}$ à 20°C ,
mais **l'eau reste dans A !**
En haut de A, $h > 0.24 \text{ m}$ d'eau $\Rightarrow P < 0$



vers la pompe

La sève des arbres

sequoias : 115,6 m

= -11,3 bar en hydrostatique


autres facteurs (sécheresse...)

jusqu'à - 50 bar !

l'eau monte par évapo-transpiration

arbre artificiel


Wheeler et Stroock *Nature* 2008




Centrifugation

Osborne Reynolds 1886, cited in
Worthington *Phil. Trans. A.* 1892

Briggs, *J. Appl. Phys.* 1950



$$P_{\text{centre}} = P_{\text{ext}} - \frac{1}{2} \rho \omega^2 r^2$$



Cavitation acoustique : notre méthode



transducteur
piezoélectrique
hémisphérique

focalise
quelques cycles
à 1MHz

Herbert, Balibar, Caupin *PRE* 2006

cavitation $\Rightarrow$ **écho**
cohérent avec d'autres
méthodes de détection
(Schlieren et son audible)

- petit volume
- courte durée
- loin des parois

taux de
nucléation :
 $10^{11} \text{ mm}^{-3} \text{ s}^{-1}$

